



Optigard[®] LT
Inseticida

syngenta[®]

(TIAMETOXAM)

Eficaz no controle de cupins subterrâneos,
cupins-de-madeira-seca, formigas urbanas, moscas (larvas e
adultos), baratas e pulgas.

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROIBIDA A VENDA LIVRE

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Peso Líquido: 20 g

(2 sachês hidrossolúveis de 10 g cada)

“Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, “shopping centers”, residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros”.

COMPOSIÇÃO:

Ingrediente ativo: TIAMETOXAM 25.0% m/m
Ingredientes inertes, tensoativos: 75.0% m/m

MODO DE USAR:

OPTIGARD LT: Grânulos dispersíveis em água, com 250 g de ingrediente ativo por Kg. Não é necessário abrir o sachê hidrossolúvel, ele se dissolve totalmente na água.

Controle de cupins subterrâneos: Diluir 2 sachês de 10g de OPTIGARD LT em 10 litros de água.

Tratamento pré-construção: Diluir o produto na concentração indicada na tabela. Antes da pavimentação, aplicar 5 litros da calda por m² sobre o solo. Após a construção da estrutura, fazer trincheira ao longo da mesma, com 15 cm de largura e 30 cm de profundidade; aplicar 5 litros de calda por metro linear.

Tratamento pós-construção: Diluir o produto na concentração indicada na tabela. Após inspeção, verifique as entradas e acessos dos cupins. Com a planta da edificação, perfure o piso ao longo do perímetro das paredes e estruturas com furos a cada 30 cm. Em paredes de blocos ociosos, perfure-os a cada 15 cm, formando barreira, iniciando a uma altura de 10 a 20 cm do solo. Aplique 2,5 litros de calda por metro linear nesses orifícios e depois tape-os.

| Praga | Ingrediente ativo/área (aproximadamente) g i.a/m ² | Dose OPTIGARD LT g por 10L de água | Área tratada m linear/ 10L |
|---------------------|---|------------------------------------|----------------------------|
| Cupins subterrâneos | 2.5g | 20g | 2 a 4m |

Controle de cupim-de-madeira-seca: Diluir 10 g (1 sachê hidrossolúvel) de OPTIGARD LT em 5 litros de água e injetar, por micropulverização ou aspersão em aerossol, a quantidade máxima de 20mL de calda por furo. Os furos devem estar separados a uma distância de 30 cm entre si, podendo-se aproveitar os furos causados pela infestação na peça. O técnico da empresa controladora de pragas deverá avaliar o tipo de madeira a ser tratada, certificando-se de que não haja riscos de causar expansão, manchas, deformidade, inchamento ou outros danos ao material a ser tratado, em decorrência do uso da água como solvente.

Controle de Formigas urbanas: Diluir 10 g (1 sachê hidrossolúvel) de OPTIGARD LT em 5 litros de água e aplicar uniformemente (100m²) onde as formigas ocorrem, principalmente em pisos, tacos, gramados, frestas, cantos, formando superfície tratada em áreas internas e externas. Na aplicação interna das instalações não aplicar em barreira, deve-se realizar uma aplicação localizada e dirigida nos cantos, ninhos, frestas e rachaduras. A reaplicação deve ser realizada após um intervalo mínimo de 7 dias, devendo-se realizar no máximo 6 aplicações por ano no mesmo local.

Controle de Moscas (adultos): Diluir 40 g (4 sachês hidrossolúveis) de **OPTIGARD LT** em 2,5 litros de água e aplicar uniformemente (50 m²) onde a praga ocorre, pousa e se esconde. Aplicar no teto, paredes, janelas, portas, cantos, e superfícies onde as moscas pousam.

Controle de Moscas (larvas): Diluir 10 g (1 sachê hidrossolúvel) de **OPTIGARD LT** em 5 litros de água e aplicar uniformemente em 15 m² em locais tais como esterco, lixo e demais focos de larvas como fezes e matéria orgânica.

Controle de Pulgas: Diluir 10 g (1 sachê hidrossolúvel) de **OPTIGARD LT** em 5 litros de água e aplicar uniformemente (100 m²) onde as pulgas ocorrem, principalmente em pisos, tacos, gramados, frestas e cantos em áreas internas e externas.

Controle de Baratas: Diluir 40 g (4 sachês hidrossolúveis) de **OPTIGARD LT** em 2,5 litros de água e aplicar uniformemente (50 m²) onde as baratas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos e rachaduras.

| Praga | Ingrediente ativo/área (aproximadamente) g i.a/m ² | Dose OPTIGARD LT g por 10L de água | Área tratada m linear/ 10L |
|----------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|
| Formigas e Pulgas | 25 mg | 10 g/ 5L de água | 100 m ² |
| Moscas (larvas) | 167 mg | 10 g/ 5L de água | 15 m ² |
| Moscas (adultos) e Baratas | 200 mg | 40 g/ 2.5L de água | 50 m ² |

REENTRADA:

Não é permitida a permanência de animais e pessoas na área que está sendo tratada, durante a aplicação. Recomenda-se não entrar no local tratado até que as gotas do produto sequem. Manter as portas e janelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem.

RESTRIÇÕES DE USO:

O produto quando aplicado nas doses e formas recomendadas não apresenta demais restrições de uso.

PRECAUÇÕES DE USO:

- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em caso de contato direto com este produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, macacão de mangas compridas, botas, avental impermeável, luvas de borracha impermeável, protetor ocular e máscara de proteção com filtro adequado.
- Antes de descartar as embalagens vazias, realizar tríplice lavagem das mesmas: colocar água limpa, tampar e agitar vigorosamente por cerca de 30 segundos. Repetir esta operação pelo menos 3 vezes, aproveitando a água da lavagem para preparo da calda inseticida.
- Para descarte de embalagem, observe a legislação Municipal, Estadual ou Federal. Restos de embalagens devem ser adequadamente embalados, usando-se luvas e sacos de descarte de material e enviados ao distribuidor ou ao programa de reciclagem aprovado e credenciado.
- Consulte a Syngenta, distribuidor ou órgão ambiental sobre os procedimentos adequados.
- Após a aplicação tome banho e troque de roupa. Não misture a roupa contaminada com a de uso diário.
- É recomendado que o controlador de pragas avalie o local a ser tratado antes da aplicação e certifique-se de que as superfícies porosas e absorventes podem receber o tratamento com o produto. Superfícies mais absorptivas podem, ocasionalmente, apresentar sinais após aplicação de caldas inseticidas, água e outros líquidos.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

- Conserve em temperatura ambiente entre 15 e 30°C.
- Proteja da umidade.

FABRICADO POR:

KWIZDA Agro GmbH

Laaer Bundestrasse, Kwizda Allee 1 - A 2100
- Leobendorf – Áustria

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

Rodovia Professor Zeferino Vaz, SP 332, s/nº, km 127,5 -
Bairro Santa Terezinha, Paulínia - SP - CEP: 13148-915 -

CNPJ: 60.744.463/0010-80.

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

C.A.S.A. 0800 704 4304

Registro no M.S. nº 3.0119.6637

“O nome do produto e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta”.

| |
|---|
| INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO |
| Grupo químico: neonicotinóide |
| Nome comum: TIAMETOXAM |
| Antídoto: tratamento sintomático |
| Telefone de emergência 24 horas: 0800 704 4304 |

| | |
|--------------------|--|
| Nº de Lote | 4 anos a partir da data de fabricação. |
| Data de Fabricação | |
| Prazo Validade | |